

Les jeunes et la prévention contre le VIH / Sida

Sondage Ifop pour Sidaction

Contact Ifop :

Frédéric Dabi

Directeur Général Adjoint de l'Ifop

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44 / 06 16 97 06 01

frederic.dabi@ifop.com

Mars 2015



1 | La méthodologie



Etude réalisée par l'Ifop pour Sidaction

Echantillon	Méthodologie	Mode de recueil
 L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 993 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans.	 La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée, niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération.	 Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 16 mars 2015.

2 | Les résultats de l'étude




A | Les représentations associées au VIH / SIDA

Les représentations associées à la contamination par le VIH / SIDA

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans









■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Plutôt pas d'accord ■ Pas du tout d'accord

Le niveau d'information sur les différents éléments relatifs à la prévention du VIH

QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans

- Récapitulatif TOTAL « D'accord » -



Rappels :


Nov. 2009 : sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 20 au 24 novembre 2009 auprès d'un échantillon de 604 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

Nov. 2013 : sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction et Elus Locaux Contre le Sida réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 novembre 2013 auprès d'un échantillon de 604 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

Nov. 2014 : sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction et Elus Locaux Contre le Sida réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 18 novembre 2014 auprès d'un échantillon de 610 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.


QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans




QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / SIDA ?


Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans




Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession du chef de ménage



Niveau d'éducation



Exposition à un risque de contamination






■ Personnes ayant une méconnaissance du VIH / SIDA
■ Ensemble des Français

B I Les pratiques sexuelles à risque des jeunes de 15 à 24 ans

L'exposition à un risque de contamination par le VIH / SIDA

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, diriez-vous que vous vous êtes exposé tout à fait fréquemment, plutôt fréquemment, plutôt pas fréquemment, pas du tout fréquemment au risque d'être contaminé par le VIH / SIDA ?




Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans



L'expérience d'un rapport sexuel au cours des douze derniers mois

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous eu un rapport sexuel... ?


Base : Ensemble des personnes âgées de 15 à 24 ans



L'utilisation d'un préservatif lors de son dernier rapport sexuel

QUESTION : Avez-vous, vous et votre partenaire, utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel... ?




Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit **58%** de l'échantillon.



Le fait d'avoir un partenaire sexuel régulier actuellement

QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?


Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit **58%** de l'échantillon.



Le fait d'avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement

QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **44%** de l'échantillon .



Sexe de la personne interrogée

84



Homme

93



Femme

Age de la personne interrogée

100



15 à 17 ans

91



18 à 20 ans

88




21 à 24 ans

L'utilisation d'un préservatif lors de son dernier rapport sexuel avec son partenaire sexuel régulier

QUESTION : Avez-vous, vous et votre partenaire sexuel régulier, utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel... ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **44%** de l'échantillon .



Sexe de la personne interrogée

56



Homme

40



Femme

Age de la personne interrogée

91



15 à 17 ans

67



18 à 20 ans

32




21 à 24 ans

L'utilisation d'un préservatif lors de son dernier rapport sexuel avec son partenaire sexuel non régulier

QUESTION : Avez-vous, vous et votre(vos) partenaire(s) sexuel(s) non régulier(s), utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel... ?


Base : question posée uniquement aux personnes ayant un partenaire sexuel non régulier actuellement, soit 5% de l'échantillon.



C I Les jeunes de 15 à 24 ans et le dépistage du VIH / SIDA

QUESTION : Avez-vous, vous et votre partenaire, effectué un test de dépistage du VIH / SIDA avant votre dernier rapport sexuel sans protection ?




Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois et n'ayant pas utilisé de préservatif, soit 24% de l'échantillon



L'expérience d'un test de dépistage avant son dernier rapport sexuel

QUESTION : Vous personnellement, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH / SIDA ?


Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 58% de l'échantillon.



Les raisons expliquant la réalisation d'un test de dépistage du VIH / SIDA

QUESTION : Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH / SIDA?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois et ayant effectué un test de dépistage du VIH / SIDA, soit 30% de l'échantillon.



3 | Les principaux enseignements



- Le niveau d'information des jeunes de 15 à 24 ans sur la contamination par le VIH se maintient à un niveau élevé, **94% d'entre eux étant désormais au courant de l'existence de traitements** permettant de vivre après avoir contracté le virus (+4 points par rapport à 2013).
- **Pour autant, le sida continue de faire peur à plus de quatre jeunes de 15 à 24 ans sur cinq (83%).** Qui plus est, bien que minoritaires, les jeunes estimant que le nombre de contaminations baisse en France sont de plus en plus nombreux depuis 2009 (38%, +13 points), tout comme ceux qui considèrent qu'ils ont « moins de risque que les autres » d'être contaminés (33%, +11 points) ou encore qu'il existe des médicaments pour « guérir » du sida (23%, +10 points, mais en baisse de 5 points, toutefois, par rapport à 2014). Enfin, un jeune sur dix suppose que l'on peut détecter la contamination d'une personne par le virus du sida en l'observant attentivement. Ces derniers résultats montrent qu'il apparaît **nécessaire de maintenir l'information des jeunes sur l'épidémie du sida, les traitements et les risques.**
- Concernant précisément la transmission du VIH, **les 15-24 ans interrogés déclarent connaître à la quasi-unanimité les principales pratiques à risque. Le rapport sexuel sans préservatif est ainsi perçu comme la pratique la plus dangereuse,** 98% d'entre eux le jugeant comme tel (dont 91% de réponses fermes). En outre, pour 98% d'entre eux, le virus peut être transmis en se faisant piquer avec une seringue usagée, et pour 96%, en entrant en contact avec le sang d'une autre personne. En outre, plus des trois quarts d'entre eux sont conscients de possibles risques de transmission en se faisant piercer ou tatouer (76%). A l'inverse, seule une minorité d'entre eux considère que l'on peut contracter le VIH en embrassant une autre personne (15%), en s'asseyant sur un siège de toilettes publiques (13%), en buvant dans le verre d'une autre personne (12%) ou en entrant en contact avec la transpiration d'une autre personne (10%). En outre, seuls 5% des personnes interrogées estiment que le virus peut se transmettre par une simple poignée de main.

- **Les moyens d'empêcher la transmission du VIH sont bien identifiés par cette population, en particulier le préservatif masculin, que 98% des 15-24 ans jugent efficace**, et même « tout à fait » efficace pour deux tiers d'entre eux. L'efficacité du préservatif féminin est reconnue, en revanche, par moins des trois quarts (73%) d'entre eux, alors même qu'il constitue à ce jour, avec le préservatif masculin, l'un des seuls moyens de se protéger de tout risque de contamination lors d'un rapport sexuel. Près ou plus de neuf jeunes sur dix sont conscients, dans le même temps, que les pilules contraceptives, les produits de toilette intime ou le paracétamol ne permettent pas de se protéger du VIH. Il reste toutefois **impératif de poursuivre ou de renforcer l'information auprès des jeunes sur les façons de se protéger**, afin d'atteindre, en particulier, ces minorités de 15-24 ans qui considèrent à tort ces derniers moyens cités comme efficaces, ce qui constitue dans une logique d'extrapolation un part non négligeable de ces jeunes.
- Malgré cette large reconnaissance du préservatif masculin comme étant un moyen efficace de se protéger des risques d'infection, **l'utilisation de celui-ci lors d'un rapport sexuel n'apparaît pas toujours comme évidente**. En effet, si la majorité des 15-24 ans ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois affirme avoir utilisé un préservatif, ce n'est pas le cas pour plus de deux d'entre eux sur cinq (42%). Toutefois, **des disparités se font jour selon le sexe et l'âge des personnes interrogées**, les hommes sont ceux qui déclarent avoir le plus utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport (69% contre 48% des femmes), ce qui semble s'expliquer par le fait qu'ils sont moins nombreux que les femmes (68% contre 81%) à avoir un partenaire sexuel régulier. De même, les personnes les plus jeunes de cette tranche d'âge (les 15-17 ans) ont davantage utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport que les 18-20 ans (83% contre 75%) et surtout que les personnes âgées de 21 à 24 ans (44%), et ce sont, là aussi, les moins nombreuses à avoir un partenaire régulier (50% contre 72% des 18-20 ans et 80% des 21-24 ans).

- Sur la question du dépistage, enfin, **seule une courte majorité de jeunes de 15 à 24 ans ayant eu un rapport sexuel dans l'année écoulée déclare avoir déjà effectué un test** (52%, et seulement 42% pour les hommes), et **la proportion n'est pas beaucoup plus importante chez les personnes pour qui ce rapport était sans protection** : 55% d'entre eux déclarent qu'ils ont effectué un test de dépistage, et 50% seulement affirment que leur partenaire a aussi effectué un test.
- **Dans la plupart des cas, le test est effectué pour ne plus avoir à utiliser le préservatif (39%)** ou simplement pour faire un bilan de santé (36%). Plus rarement, ce sont l'exposition à un risque de contamination (15%) ou une proposition de son médecin (10%) qui sont à l'initiative de la réalisation du test. Enfin, le dépistage a été fait parce que la personne ou son partenaire attendait un enfant dans seulement 5% des cas – ce qui s'explique par l'âge de la population interrogée –, ou encore sans raison particulière (19%) ou pour d'autres raisons que celles proposées (9%). Aussi au-delà d'une information nécessaire sur les moyens de se protéger du VIH, c'est un discours tout autour de son dépistage qui doit aujourd'hui être renforcé auprès de ces jeunes.